

新型コロナワクチン

4回目接種後の副反応アンケート 集計結果

【目的】

新型コロナワクチン追加接種後の副反応の状況を調べるために実施。

【分析対象】

新型コロナワクチンの4回目接種を受けた方のうち、回答のあった85名。

【調査期間】


令和4年6月26日～令和4年9月30日

【調査方法】

集団接種会場にてアンケートチラシを配布し、チラシに掲載したコードをスマートフォン等から読み取り、インターネット上で回答を得た。


【調査結果】

(1)初回接種を受けたワクチンのメーカーについて (n=85)




回答者の約9割がファイザー社、約1割が武田/モデルナ社のワクチンで初回接種を受けていた。


(2)3回目接種を受けたワクチンのメーカーについて (n = 85)




(3)今回接種を受けたワクチンのメーカーについて (n = 85)




(4)接種日からの経過日数について (n = 85)




(5)回答者の性別について (n =85)




(6)回答者の年代について (n =85)




(7)薬や薬品などで重いアレルギー症状を起こしたことがあるかについて (n =85)




(8)接種部位の症状があるかについて (n = 85)




(9)具体的な接種部位の症状について（複数回答可）



(10)全身症状があるかについて (n = 85)




(11)具体的な全身症状について（複数回答可）




最も多かったのは「倦怠感」
25%であった。

(12)これまでの接種と比較して、4回目接種での副反応について（n = 85）



回答者の約 8 割がこれまでより症状
が軽い、または同程度だった。

(13)男女での症状の出現割合について（n = 85）



男女別でみると接種部位の症状、
全身症状ともに女性の出現割合が
男性より高くなっていた。
接種部位の症状（p < 0.05）
全身症状（p < 0.05）